

Un basidiomycète : *Amanita codinae*

Deux récoltes dans la même station à quelques jour d'intervalle :

1 – Deux exemplaires à pied coupé (récolteur inconnu) faisant l'objet d'une note séparée.

2 – Une demi-douzaine de spécimens adultes. Leg. Georges BOUCARD (85) Le Bernard, mi-novembre 2009. Det. J.Y. JUTARD, confirmée par J.B.

Habitat : en groupe dans un pré abondamment fumé (troupeaux), sur terrain probablement argilo-calcaire présentant une légère dépression entretenant l'humidité.

Description de l'exemplaire qui m'a été confié, les autres ayant été emportés par J.Y. J. aux journées mycologiques de Piriac (44) :

Chapeau Ø 13,5 cm, convexe-étalé, couvert au disque de squames brunes presque contiguës aplaties, vaguement polygonales, munies d'une petite proéminence plus foncée à pointe +/- accusée ; en périphérie les squames deviennent laineuses, larges, de couleur beige-café au lait avec l'extrémité brun sombre retroussée conique facilement détersile ; marge laineuse mais non striée, excédante par des lambeaux du voile partiel.

Lames à reflet glauque puis avec tendance à un léger brunissement qui s'accroît par dessiccation.

Pied brunâtre jaunissant à manipulation, lg. 13 cm, Ø 2 cm, cylindrique, légèrement clavé inférieurement et atténué à l'extrême base ; couvert de squames brunes étagées, ascendantes et nettement plus nombreuses et pointues vers la partie supérieure. Anneau haut placé blanc, membraneux, avasé en jupette, garni de flocons bruns à la face inférieure près de la marge.

Spores amyloïdes, ellipsoïdes, 12-13 x 8,5-9 µm. Q # 1,4

Eléments du voile très divers de forme et de dimensions, figurés ci-contre à droite en bas.

Jacques BOIFFARD

