

# Différents syndromes (suite) à l'origine des intoxications par les champignons



## A – Les syndromes à délais courts :

- **Syndrome coprinien** : (le risque peut exister plusieurs jours après l'absorption des Champignons)  
La substance toxique est la coprine, elle empêche l'oxydation de l'alcool (accumulation d'aldéhydes).  
On comprendra mieux pourquoi, il n'est pas recommandé de prendre de l'alcool en mangeant le coprin noir d'encre (*Coprinus atromentarius*).  
Les malaises interviennent de 30 minutes à 2 heures après l'absorption d'alcool. Ils se traduisent par des rougeurs de la face et du cou avec des bourdonnements d'oreilles, diarrhées, nausées et vomissements.  
On peut observer aussi quelques troubles du rythme cardiaque.
- **Syndrome psilocybien** :  
La législation interdit la récolte, la détention, et le transport de certaines espèces comme le psilocybe semilanceata, le psilocybe callosa, ou le psilocybe cubensis.  
La substance toxique contenue dans ces champignons, la psilocybine est une substance voisine du LSD dans on connaît les méfaits.  
Les symptômes surviennent 30 minutes après la consommation, on note une atteinte du système nerveux central avec anxiété, nausées, asthénie, vertiges, hallucinations, éventuellement tendance suicidaire. Troubles visuels, agressivité, désorientation. Symptômes qui disparaissent environ 10 heures après, souvent des complications s'ensuivent et une hospitalisation n'est pas à exclure.

## B – Syndromes à délais longs (plus de 6 H.) :

- **Syndrome phalloïdien** :  
Pronostic le plus sévère : mortalité (entre 10 et 20 % des cas)  
La substance toxique contenue dans ces champignons, est l'amanitine, toxine contenue dans les amanites phalloïdes – printanières – vireuses, certaines lépiotes et la galère marginée.

### Au début 3 critères:

- incubation 12 h. en moyenne
- diarrhée intense
- atteinte du foie

### 3 formes :

- bénigne caractérisée par une gastro entérite 3 à 5 jours avec une atteinte du foie modérée
  - moyenne avec hépatite aiguë
  - grave avec hépatite aiguë + hémorragie digestive + confusion
- Sous réanimation les signes régressent dans 8 à 10 jours avec guérison complète dans 8 à 18 semaines.  
Il y a risque de décès autour du 11<sup>ème</sup> jour.

NB : Les autres syndromes seront traités dans un prochain bulletin.

G. BOUCARD